Westenhage
Huisartsenpraktijken

Betreft: longfunctieonderzoek bij kinderen

Hallo .....,

Op ..... om ..... uur heb je een afspraak voor een longfunctieonderzoek (blaastest) in onze praktijk. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door ..... de praktijkverpleegkundige en duurt ongeveer 60 minuten.

In deze brief leggen wij uit waarmee je voor het onderzoek rekening moet houden. Wil je deze brief daarom goed lezen en de instructies volgen?

Voor een betrouwbaar resultaat van het onderzoek is het belangrijk dat je bepaalde geneesmiddelen voor de longen **niet gebruikt**. Voor jou is dat:

8 uur voorafgaande aan het onderzoek **niet gebruiken**:
- Atrovent = ipratropium
- Ventolin = salbutamol
- Berotec = fenoterol
- Bricanyl = terbutaline
- Berodual = fenoterol/ipratropium
- Combivent = salbutamol/ipratropium

12 uur voorafgaande aan het onderzoek **niet gebruiken**:
- Flutiform = formoterol/fluticason
- Foradil = formoterol
- Foster = formoterol/beclometason
- Oxis = formoterol
- Serevent = salmeterol
- Seretide = salmeterol/fluticason
- Symbicort = formoterol/budesonide

Daarnaast is het voor het onderzoek belangrijk dat je:
- 15 minuten voor het onderzoek aanwezig bent, zodat je uitgerust aan het onderzoek begint;
- 30 minuten voor het onderzoek niet eet (voor een warme maaltijd geldt 1 uur);

Tijdens het onderzoek wordt je gevraagd om na de eerste metingen een geneesmiddel te inhaleren. Na 15 minuten inwerken daarvan wordt je longfunctie nogmaals gemeten.

Wil je de door jou gebruikte longmedicatie (meestal pufjes) meenemen naar het onderzoek? De wijze waarop je deze middelen gebruikt, kan ook worden besproken bij het onderzoek.

De praktijkverpleegkundige bespreekt het onderzoek na met jouw huisarts. Er wordt een vervolgafspraak gemaakt waarin de uitslag van het onderzoek met je kan worden doorgenomen.

Met vriendelijke groet,

Huisartsenpraktijken Westenhage