Westenhage
Huisartsenpraktijken

Betreft: longfunctieonderzoek bij volwassenen

Geachte heer/mevrouw,

U heeft een afspraak voor een longfunctieonderzoek (blaastest) in onze praktijk. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de praktijkverpleegkundige en duurt ongeveer 45 minuten.

In deze brief leggen wij uit waarmee u voor het onderzoek rekening moet houden. Wilt u deze brief daarom goed lezen en de instructies volgen?

Voor een betrouwbaar resultaat van het onderzoek is het belangrijk dat u bepaalde geneesmiddelen voor de longen **niet gebruikt**.

Per medicijn is dit een bepaald aantal uren tevoren NIET gebruiken.

8 uur voorafgaande aan het onderzoek **niet gebruiken**:
- Atrovent = ipratropium
- Ventolin = salbutamol
- Berotec = fenoterol
- Bricanyl = terbutaline
- Berodual = fenoterol/ipratropium
- Combivent = salbutamol/ipratropium

12 uur voorafgaande aan het onderzoek **niet gebruiken**:
- Flutiform = formoterol/fluticason
- Foradil = formoterol
- Foster = formoterol/beclometason
- Oxis = formoterol
- Serevent = salmeterol
- Seretide = salmeterol/fluticason
- Symbicort = formoterol/budesonide

24 uur voorafgaande aan het onderzoek **niet gebruiken**:
- Spiriva = tiotropium
- Incruse = Umeclidinium

48 uur voorafgaande aan het onderzoek **niet gebruiken**:
- Relvar = fluticasonfuroaat/vilanterol

Als u denkt dat u door het niet gebruiken van deze geneesmiddelen te veel hinder heeft van uw benauwdheid, kunnen wij het onderzoek vroeg in de ochtend plannen.

Daarnaast is het voor het onderzoek belangrijk dat u:

- 15 minuten voor het onderzoek aanwezig bent, zodat u uitgerust aan het onderzoek begint;
- 30 minuten voor het onderzoek niet eet (voor een warme maaltijd geldt 1 uur);
- Tenminste 60 minuten voor het onderzoek niet meer rookt.

Alle medicijnen die u niet voor uw longen gebruikt, zoals geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk, suikerziekte, de pil enzovoort, kunt u gewoon blijven gebruiken. Deze middelen hebben geen invloed op uw longfunctie.

Tijdens het onderzoek wordt u gevraagd om na de eerste metingen een geneesmiddel te inhaleren. Na 15 minuten inwerken daarvan wordt uw longfunctie nogmaals gemeten.

Wilt u de door u gebruikte longmedicatie (meestal pufjes) meenemen naar het onderzoek? De wijze waarop u deze middelen gebruikt, kan ook worden besproken bij het onderzoek.

De praktijkverpleegkundige bespreekt het onderzoek na met uw huisarts. Er wordt een vervolgafspraak gemaakt waarin de uitslag van het onderzoek met u kan worden doorgenomen.

Met vriendelijke groet,

Huisartsenpraktijken Westenhage